



Dopo la chirurgia orale

Scheda generale da accompagnare alle istruzioni personali e alla prescrizione

Farmaci

Assumere soltanto i farmaci prescritti per il proprio caso, rispettando nome, dose, intervalli e durata indicati nella prescrizione personale. Antibiotici e gastroprotettori non sono automatici. Non usare aspirina come analgesico di propria iniziativa; non sospendere aspirina o altri antiaggreganti/anticoagulanti già prescritti senza indicazione del medico.

Prime ore e alimentazione

Finché persiste l'intorpidimento evitare di mordere labbra o guance e assumere cibi o bevande troppo caldi. Preferire alimenti morbidi e non caldi; evitare traumi alla ferita. Riposare, evitare sforzi e seguire le indicazioni ricevute su fumo e attività. In caso di sedazione seguire le specifiche istruzioni di dimissione, compresi accompagnamento e guida.

Ghiaccio

Se indicato, applicare un impacco freddo esterno avvolto in un panno, a intervalli brevi alternati a pause. Non applicare ghiaccio direttamente sulla pelle e non mantenerlo continuamente. Tempi e frequenza vengono precisati nelle istruzioni personali.

Igiene e sciacqui

Nelle prime 24 ore evitare sciacqui energici e manipolazioni della ferita. Continuare l'igiene delle altre zone senza traumatizzare quella operata; dal giorno successivo pulire delicatamente secondo le indicazioni del professionista. Usare clorexidina o altri prodotti solo se indicati, con formulazione e durata prescritte.

Sanguinamento

Una saliva leggermente striata di sangue può verificarsi. Per sanguinamento dalla ferita applicare una garza pulita e mantenere una pressione continua mordendo per almeno 20 minuti, senza sollevarla ripetutamente. Se persiste o aumenta, contattare subito lo studio o un servizio sanitario. Non fare sciacqui con acqua ossigenata e non assumere Ugurol/acido tranexamico di propria iniziativa: eventuali impieghi richiedono una prescrizione specifica.

Quando chiedere assistenza

Contattare lo studio per dolore non controllato, sanguinamento persistente, febbre o gonfiore in aumento, secrezioni, sensibilità alterata oltre il tempo previsto o altri sintomi inattesi. Per difficoltà respiratoria, difficoltà marcata a deglutire, gonfiore rapidamente progressivo o emorragia importante chiedere assistenza urgente, chiamando il 112.

Contatti: Casalotti 06 61561828 - Via Cornelia 06 6241645. Lo studio non è un servizio di emergenza attivo 24 ore. In assenza di risposta, per un problema urgente rivolgersi a un servizio sanitario.

Intervento / data / controllo programmato / riferimento alla prescrizione